



# CAVOLO, BROCCOLO, CAPPUCCIO, CAVOLFIORE



<b>EPOCA PRATICA</b>	<b>NOTE</b>	<b>PRODOTTO</b>	<b>DOSI</b>	<b>CONSIGLI TECNICI</b>
DISINFEZIONE DEL TERRENO	Geodisinfestante	<b>FORCE</b>	15-20 kg/ha	
DISERBO	In pre-trapianto	<b>SIAFEN</b>	1-1,2 lt/ha	
		<b>PENTHIUM EC</b>	2,75 lt/ha	
	In post-trapianto	<b>BUTISAN S</b>	1,5-2 lt/ha	
	Graminicida post-emergenza	<b>FUSILADE MAX</b>	1,5-2 lt/ha	
		<b>STRATOS ULTRA</b>	1,5-2 lt/ha	
		<b>AGIL</b>	1-1,2 lt/ha	
		<b>STRATOS</b>	1-1,2 lt/ha	
	<b>DIFESA FITOSANITARIA</b>			
MALATTIE FUNGINEE	Peronospora	<b>IPERION *</b>	200 gr/hl	20 gg di carenza
		<b>COPRANTOL Hi Bio *</b>	150-200 gr/hl	20 gg di carenza
		<b>KOCIDE 3000 *</b>	300 gr/hl	20 gg di carenza
	Pythium (semenzaio)	<b>PREVICUR ENERGY</b>	100-150 gr/hl	20 gg di carenza
	Alternaria	<b>SIGNUM</b>	100-150 ml/hl	3 gg di carenza
		<b>ROVRAL FL</b>	300 ml/hl	21 gg di carenza
	Marciumi	<b>RIZOLEX GOLD</b>	200 gr/hl	15 gg di carenza
	PARASSITI ANIMALI	Afdi	<b>PIRETRO VERDE *</b>	100 gr/hl
<b>BAYTEROID EW</b>			0,5 lt/ha	7 gg di carenza
<b>METEOR</b>			0,9 lt/ha	3 gg di carenza
<b>KARATE ZEON 1,5</b>			70-100 ml/hl	7 gg di carenza
<b>AFFIRM</b>			1,5 kg/ha	3 gg di carenza

**Note tecniche di difesa**

	Nottue	<b>BACILLUS THUR. *</b>	150 gr/hl	3 gg di carenza
		<b>SUCCESS *</b>	80-100 ml/hl	3 gg di carenza
		<b>LASER *</b>	20-25 ml/hl	3 gg di carenza
		<b>DURSBAN 75 WG</b>	55-70 gr/hl	30 gg di carenza, prodotto registrato solo su Cavolo cappuccio

**\* AMMESSO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA**