



# TABACCO



<b>EPOCA PRATICA</b>	<b>NOTE</b>	<b>PRODOTTO</b>	<b>DOSI</b>	<b>CONSIGLI TECNICI</b>	
DISERBO	In presenza di infestazioni di elateridi	<b>FORCE</b>	12-15 kg/ha		
		<b>MICRONOL T5</b>	12-15 kg/ha		
		<b>MOCAP</b>	100 kg/ha		
	Pre-trapianto		<b>TOUCHDOWN</b>	5-6 lt/ha	Sui colmi in pre-trapianto
			<b>SILGLIF NF</b>	3-4 lt/ha	
	Pre-emergenza		<b>STOMP ACQUA</b>	3-4 lt/ha	
			<b>PENTHIUM</b>	1-2,5 lt/ha	
			<b>COMMAND 36 CS</b>	0,5 lt/ha	
	Graminicida di post-emergenza		<b>AGIL</b>	1-1,2 lt/ha	
			<b>FUSILADE MAX</b>	1,5-2 lt/ha	
<b>DIFESA FITOSANITARIA</b>					
MALATTIE FUNGINEE	Peronospora - Alternari	<b>RIDOMIL GOLD R</b>	300 gr/hl	Il primo trattamento va effettuato 18-20 gg dal trapianto	
		<b>RIDOMIL MZ</b>	300 gr/hl		
		<b>EUCRIT MZ</b>	250-300 gr/hl		
PARASSITI ANIMALI	Nottue	<b>DURSBAN 75 WG</b>	55-70 gr/hl	Effettuare il primo intervento subito dopo la rincalzatura bagnare bene la vegetazione (10 hl/ha) e alternare il tipo di prodotto	
	Afide e Pulce del tabacco	<b>KARATE ZEON 1,5</b>	100-130 ml/hl		
		<b>CONFIDOR O-TEQ</b>	50 ml/hl		
		<b>ACTARA 25 WG</b>	20 gr/hl		
		<b>EPIK</b>	100 gr/hl		
PRIMO TRATTAMENTO	Bottone florale inizio fioritura	<b>DE SPROUT</b>	3,5-4 %	Eseguire il trattamento entro 24 ore dalla cimatura	
SECONDO TRATTAMENTO	Dopo sette giorni dal primo	<b>DE SPROUT</b>	3,5-4 %	Completare la cimatura delle piante non cimare il primo passaggio	
TERZO TRATTAMENTO	Dopo dieci giorni dal secondo	<b>EMME H 60 WSS</b>	4 kg/ha	Trattare con 500 litri di acqua	

