




Informazioni agrometeorologiche, fitosanitarie ed osservazioni di campagna
www.agrinorddest.it

Stagione Primavera
20/3 al 21/6






Previsioni per :		Venerdì 30	M a g g i o	Sabato 1	Domenica 2	Lunedì 3
Stato del cielo						
Probabilità di precipitazione	00-12	Media 40%		Media 40%	Media 40%	Bassa 20%
	12-24	Media 50%		Bassa 20%	Bassa 20%	Bassa 20%
Fenomeni particolari		Nuvolosità consistente/rovesci		Isolati rovesci/schiarite	Nuvolosità variabile	Nuvolosità in diminuzione
Temperatura prevista		Massima 20,0 Minima 13,0		Massima 20,8 Minima 13,2	Massima 20,0 Minima 12,5	Massima 20,5 Minima 11,0
Sole :Sorge :Tramonta		6,06 20,22		6,05 20,23	6,03 20,24	6,02 20,25

Somme termiche 2021			e 2020	Media storica	Situazione generale La pressione si mantiene da qualche giorno su valori medio-bassi. Correnti da Ovest mantengono condizioni di elevata nuvolosità e isolati rovesci.
Base 0	858,1	991,7	852,1		
Base 10	81,5	153,6	113,6		

Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia
Zona pianura - Aprile 2021




Grafici relativi alla durata in ore della bagnatura fogliare dei giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì.





Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia Zona collina - Aprile 2021



VARIE

Anche in questi ultimi tre giorni, le temperature medie giornaliere si sono (di poco) posizionate al di sotto delle medie del periodo mantenendo una situazione particolarmente "fresca".

Le piogge che si sono registrate hanno mediamente apportato quantitativi di acqua limitati e non uniformi sul territorio, ma sono state sufficienti a dare origine, in particolare quelle del giorno 26/27, a lunghi periodi di bagnatura. Nelle località interessate dalle piogge è stato segnalato l'inizio di una infezione di TICCHIOLATURA. Nell'occasione è stata anche osservata la presenza di ALTERNARIA. È terminata il giorno 26, la prima infezione di ticchiolatura iniziata con le piogge del giorno 11 e in questi giorni si potrebbero trovare sulle foglie le relative macchie.

Nelle uniche tre giornate in cui le temperature medie giornaliere hanno superato la soglia dei 14 gradi, (il 23, 24 e 25) nelle trappole per il monitoraggio della popolazione di CIMICE ASIATICA sono stati catturati degli adulti che presumibilmente sono ancora limitatamente attivi e non si sono spostati definitivamente dai ricoveri invernali.

Dalla analisi dei modelli previsionali risulta che le OOSPORE di PERONOSPORA della vite, hanno raggiunto la fase di maturità; la attuale fase fenologica di molte varietà, sia in collina che in pianura, si colloca tra quella di "foglie distese" e "grappoli visibili" quindi sensibile ad eventuali infezioni in caso di pioggia e bagnature prolungate. Molto alto permane il rischio di infezioni di OIDIUM

Situazione di campo del 28 Aprile : Melo: Si trova mediamente nella fase di "allegagione", ma con fioriture ancora in corso e/o appena terminate. **Vite;** fase fenologica tra i "foglie distese" e "grappoli visibili" in funzione della zone e



Il prossimo aggiornamento verrà effettuato: Lunedì 3 Maggio 2021