








Previsioni per :		Venerdì 4	Sabato 5	Domenica 6	Lunedì 7
Stato del cielo					
Probabilità di precipitazione	00-12	Molto bassa 5%	Bassa 10%	Bassa 20%	Bassa 20%
	12-24	Molto bassa 5%	Bassa 10%	Media 40%	Bassa 20%
Fenomeni particolari		Velature alla sera	Nuvolosità pomeridiana	Temporali alla sera/notte	Isolati temporali
Temperatura prevista		Massima 29,0 Minima 15,5	Massima 28,0 Minima 15,5	Massima 25,5 Minima 17,0	Massima 24,0 Minima 16,0
Sole :Sorge :Tramonta		5,30 21,00	5,30 21,00	5,29 21,01	5,29 21,02

Somme termiche 2021	e 2020	Media storica	Situazione generale Correnti da Sud Ovest interesseranno nelle prossime ore le nostre zone con aumento delle temperature. Probabili isolati temporali.	
Base 0	1449,2	1656,7		1487,2
Base 10	322,6	468,6		398,9

### Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia Zona pianura - Maggio 2021




### Grafici relativi alla durata in ore della bagnatura fogliare dei giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì.






### Andamento temperature medie, minime, massime, pioggia Zona collina - Maggio 2021



#### NOTA METEO:

Il mese di Maggio appena concluso, così come anche il mese di Aprile è stato ancora caratterizzato da temperature medie giornaliere che si sono costantemente mantenute al di sotto dei valori storici del periodo. Anche il terreno ha evidenziato nei vari orizzonti monitorati un andamento simile e conseguentemente la fenologia di tutti i vegetali manifesta ad oggi un ritardo valutabile sempre attorno ai 10/12 giorni. A titolo di esempio si ricorda che la fase di "fioritura" dell'actinidia "femmina", nel 2020 è stata registrata nei giorni 17/19 Maggio a confronto di quest'anno osservata nel periodo 27/28; anche la fioritura della vite e dell'olivo che mediamente nel 2020 è avvenuta nei giorni 22/24 Maggio quest'anno sta iniziando in questo periodo.

CIMICE: In questi ultimi giorni si è stabilizzato il numero delle catture, le maggiori presenze di adulti osservate sono localizzate nella fascia frutticola Zevio-Legnago-Lendinara, probabilmente attirati dalla maggiore quantità alimentare, mentre nelle zone a Est di Verona la popolazione è ancora mediamente bassa. Sono state osservate ovature e nascite di neanidi.



**Situazione di campo del 2 Giugno : Vite e Olivo:** fase fenologica di "inizio fioritura". Actinidia: fase fenologica di passaggio tra "fioritura" e "allegagione" con disformità dovute ai danni da freddo.



Il prossimo aggiornamento verrà effettuato: **Lunedì 14 Giugno 2021**