



CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST

Marzo 2020

N.16


Comunicato del 5-3-2020

Informazioni agrometeorologiche, fitosanitarie ed osservazioni di campagna
www.agrinordest.it






Stagione **Inverno**
22/12/19 al 20/3/20

Previsioni per :		Venerdì 6	Sabato 7	Domenica 8	Lunedì 9	
Stato del cielo						
Probabilità di precipitazione	00-12	Bassa 20%	Media 40%	Bassa 20%	Bassa 15%	
	12-24	Media 50%	Bassa 20%	Bassa 20%	Bassa 15%	
Fenomeni particolari		Pioggie nella sera/notte	Pioggie al primo mattino	Nuvolosità variabile	Nuvolosità pomeridiana	
Temperatura prevista		Massima 10,5 Minima 3,5	Massima 12,5 Minima 6,0	Massima 10,5 Minima 1,0 ↓	Massima 8,0 Minima -1,0 ↓	
Sole :Sorge :Tramonta		6,45 18,11	6,43 18,12	6,41 18,13	6,39 18,15	
Somme termiche 2020		e 2019	Media storica	Situazione generale Si manterrà anche nelle prossime 48 ore una situazione di instabilità legata al flusso di aria fredda da Nord Ovest.		
Base 0		330,8	249,1			236,1
Base 10		0,0	0,6			1,2

Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia
Zona pianura - Marzo 2020



Grafici relativi alla durata in ore della bagnatura fogliare dei giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì.






Fasi lunari Marzo

Luna nuova Martedì 24
Primo quarto Lunedì 2
Luna piena Lunedì 9
Ultimo quarto Lunedì 16

Informazioni agrometeorologiche, fitosanitarie ed osservazioni di campagna
www.agrinordest.it

Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia Zona collina - Marzo 2020



MELO PERO:

Il melo si trova in questi giorni nella fase fenologica di "rottura gemma", mentre il pero è nel passaggio tra "inizio rigonfiamento" e "apertura gemma" in funzione della varietà. Inizierà dalla fase di "punte verdi", stimata su quasi tutte le varietà di melo dalla metà della prossima settimana, il periodo di sensibilità alle infezioni di TICCHIOLATURA nei confronti delle quali sarà opportuno predisporre un adeguato programma di difesa.

PESCO:

Si trova nella fase fenologica di passaggio tra "bottone rosa" ed "inizio fioritura". Considerando i modelli meteorologici a breve termine che prevedono una sensibile diminuzione delle temperature tra le giornate di Domenica e Lunedì, si stima che la fase di "piena fioritura" potrebbe avvenire nel periodo 10 / 14 Marzo; nell'anno 2019 la "piena fioritura" è stata osservata nel periodo 20/23 Marzo. Sono già visibili le punte verdi dei futuri germogli; questa fase è particolarmente sensibile alle infezioni primarie di BOLLA che in caso di piogge, bagnature prolungate e temperature attorno ai 5/6 gradi, è in grado di infettare giovani tessuti fogliari causando in seguito le classiche deformazioni su foglie e frutti.

ACTINIDIA:

Le varietà "gialle" manifestano un inizio di attività gemmaria con emissione delle "piumette" mentre le gemme delle varietà "verdi" non evidenziano particolari attività vegetative anche se è stato osservato in questi giorni l'inizio del "pianto" sintomo evidente della ripresa della attività radicale favorita dalle temperature del terreno e dalla dotazione idrica.

Situazione di campagna 4 Marzo 2020

Pesco: fase fenologica di "bottone rosa". **Actinidia;** le varietà gialle hanno iniziato l'ingrossamento della gemma; sulle altre è iniziato il "pianto". **Melo :** fase fenologica "rottura gemma".



Il prossimo aggiornamento verrà effettuato: Lunedì 9 Marzo 2020