



CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST

Marzo 2020

N.20

Comunicato del 19-3-2020


Informazioni agrometeorologiche, fitosanitarie ed osservazioni di campagna
www.agrinordest.it

Stagione **Inverno**
22/12/19 al 20/3/20


Previsioni per :		Venerdi 20	Sabato 21	Domenica 22	Lunedì 23
Stato del cielo					
Probabilità di precipitazione	00-12	Bassa 10%	Media 40%	Media 40%	Bassa 20%
	12-24	Bassa 20%	Media 40%	Bassa 20%	Bassa 20%
Fenomeni particolari		Equinozio di primavera	Isolati deboli rovesci	Nuvolosità consistente	Temperature in diminuzione
Temperatura prevista		Massima 19,5 Minima 7,0	Massima 17,5 Minima 7,0	Massima 13,5 Minima 6,0	Massima 5,5 Minima 3,0
Sole :Sorge :Tramonta		6,19 12,24	6,17 18,30	6,15 18,32	6,13 18,33

Somme termiche 2020		e 2019	Media storica	Situazione generale La pressione tenderà progressivamente nei prossimi giorni a diminuire, mentre un nucleo di aria fredda da Est è atteso da Lunedì.
Base 0	463,3	380,7	353,0	
Base 10	6,7	8,0	6,6	

Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia
Zona pianura - Marzo 2020






Grafici relativi alla durata in ore della bagnatura fogliare dei giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì.




Giorni di pioggia

Media mensile : 6
Dal 1 Marzo al 18 : 6




Temperatura media, minima,massima rilevata con termometro a bulbo bagnato -settimana dal 9/3/20 al 15/3/20





Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia Zona collina - Marzo 2020



ATTENZIONE AL FREDDO

Le giornate soleggiate e il conseguente aumento delle temperature hanno determinato una veloce risposta vegetativa e su tutte le arboree in genere si osservano “movimenti” o di linfa (pianto) o di sviluppo gemmario. Anche le temperature del terreno, allineate alle medie del periodo, hanno raggiunto a 25 e a 50 cm di profondità valori favorevoli all’inizio dell’attività di assorbimento. Il pesco si trova mediamente nella fase fenologica di “piena fioritura” mentre l’albicocco in quella di passaggio tra “piena fioritura” e di “inizio caduta dei petali”. Il melo si trova dalla fase di “punte verdi” nelle varietà più tardive a quella quasi di “mazzetti affioranti” in quelle più precoci, mentre il pero in quella di “apertura gemme”. Su vite si osservano evidenti rigonfiamenti delle gemme (gemma cotonosa) su varietà precoci (Glera) nelle località di collina mentre ancora nella fase di “gemma invernale” sulle altre. Nelle trappole sessuali si osserva in questi giorni un aumento delle catture di EULIA come d’altra parte avviene normalmente in questo periodo, mentre si attende tra qualche giorno l’inizio del volo di CYDIA MOLESTA che normalmente inizia a distanza di 8/10 giorni dall’EULIA.

Questo “scenario” primaverile (la primavera astronomica inizia domani 20 Marzo), è destinato ad una brusca variazione in seguito all’arrivo di un nucleo di aria fredda da Est che dalla giornata di Lunedì interesserà tutta l’Italia. Le prime zone interessate, come solitamente accade, saranno quelle più a Nord Est in estensione poi alle altre. Si consiglia quindi di prestare massima attenzione ad iniziare dalla giornata di Lunedì specialmente per le colture più esposte come pesco, albicocco susino e actinidia var.gialle.

Situazione di campagna 25 Marzo 2020

Vite: si trova mediamente nella fase di "gemma invernale". **Pesco e Albicocco;** Fase fenologica di "piena fioritura"; Attenzione ai probabili ritorni di freddo.



Il prossimo aggiornamento verrà effettuato: Lunedì 23 Marzo 2020