









Informazioni agrometeorologiche, fitosanitarie ed osservazioni di campagna
www.agrinordest.it

Stagione **Primavera**
21/3/19 al 20/6/20


Previsioni per :	Venerdi 3	Sabato 4	Domenica 5	Lunedì 6
Stato del cielo				
Probabilità di precipitazione	00-12: Bassa 10%	Molto bassa 5%	Molto bassa 5%	Molto bassa 5%
	12-24: Bassa 15%	Molto bassa 5%	Molto bassa 5%	Molto bassa 5%
Fenomeni particolari	Probabili deboli gelate	Temp.minime in aumento	Temp.minime in aumento	Velature alla sera
Temperatura prevista	Massima 14,5 Minima -0,5	Massima 17,0 Minima 1,5	Massima 16,5 Minima 4,0	Massima 17,5 Minima 4,0
Sole :Sorge :Tramonta	6,52 19,47	6,51 19,49	6,49 19,50	6,47 19,51

Somme termiche 2020	e 2019	Media storica	Situazione generale
Base 0	593,7	538,7	Nei prossimi giorni, la massa di aria fredda attualmente presente sulle nostre zone tenderà a spostarsi verso Est. Temp. minime in aumento.
Base 10	21,5	29,8	
		497,2	





Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia Zona collina - Marzo 2020



VARIE DI STAGIONE

L'impulso di aria fredda puntualmente è arrivato come annunciato e sono nuovamente ricomparse le gelate. L'entità dell'abbassamento termico è stata comunque inferiore della precedente dei giorni 23 e 24 Marzo. Come in occasione della precedente, si rimanda alla valutazione dei danni alle prossime settimane quando diverranno effettivamente evidenti. Dove si sono accesi gli impianti antibrina si sono riproposti i tipici paesaggi ghiacciati segno che l'abbassamento al di sotto dello zero è stato reale.

Il pero in questi giorni si trova nella fase di "piena fioritura", fase in cui mediamente si inizia ad osservare danni da freddo a partire da temperature attorno ai -1,6 gradi. Il melo si trova nella fase di "bottoni rosa" con variazioni in più o in meno in funzione della varietà; in questa fase la temperatura critica per inizio di danni sui fiori si ha quando la temperatura scende su valori prossimi ai -2,0 / -2,2.

La vite che si trova mediamente anche in questo caso in funzione della varietà nella fasi di passaggio tra "gemma cotonosa", con temperatura di soglia critica di -8,0 e "punta verde" con temperature critica di -2,0. Alcune varietà precoci si trovano nella fase di "apertura gemma". Le fasi vegetative sono molto rallentate, sia in seguito alla limitata disponibilità idrica sia per la diminuzione delle temperature dell'aria e del terreno.

Per ora il "timido" inizio volo di CYDIA MOLESTA osservato nei giorni 21 / 23 Marzo si è azzerato conseguentemente al rafferddamento e alle piogge, mentre è poseguito con catture in diminuzione quello di EULIA iniziato 11 Marzo.

Situazione di campagna 1 Aprile 2020

Vite: Fase fenologica media di "gemma cotonosa", "punte verdi". **Melo:** fase di "bottoni rosa". **Pero:** fase di "piena fioritura".



Il prossimo aggiornamento verrà effettuato: Lunedì 6 Aprile 2020