




Informazioni agrometeorologiche, fitosanitarie ed osservazioni di campagna  
www.agrinordest.it

Stagione **Estate**  
21/6/19 al 22/9/20


Previsioni per :		Venerdi 21	Sabato 22	Domenica 23	Lunedì 24
Stato del cielo					
Probabilità di precipitazione	00-12	Molto bassa 5%	Molto bassa 5%	Bassa 20%	Media 40%
	12-24	Molto bassa 5%	Molto bassa 5%	Media 60%	Bassa 20%
Fenomeni particolari		Foschie al mattino	Velature alla sera	Temporali nel pomeriggio/sera	Piogge residue al mattino
Temperatura prevista		Massima 33,0 Minima 19,5 ↑	Massima 34,0 Minima 20,0 ↑	Massima 32,0 Minima 20,0	Massima 28,5 Minima 19,5
Sole :Sorge		6,25	6,26	6,27	6,29
:Tramonta		20,13	20,11	20,09	20,08

Somme termiche 2020	e 2019	Media storica	Situazione generale Un flusso di correnti calde interesserà le nostre zone nelle prossime ore. Domenica probabili temporali e diminuzione delle temperature.	
Base 0	3502,6	3434,0		3323,0
Base 10	1534,5	1527,0		1458,9





Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia  
Zona pianura - Agosto 2020



Grafici relativi alla durata in ore della bagnatura fogliare dei giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì.



**Giorni di pioggia**  
Media mensile : 9  
Dal 1 Agosto al 19: 4






#### Fasi lunari Agosto

Luna nuova Mercoledì 19  
Primo quarto Martedì 25  
Luna piena Lunedì 3  
Ultimo quarto Martedì 11

Informazioni agrometeorologiche, fitosanitarie ed osservazioni di campagna  
[www.agrinordest.it](http://www.agrinordest.it)

### Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia Zona collina - Agosto 2020



#### MELO:

Sono in corso le operazioni di raccolta delle varietà precoci. La pezzatura e la colorazione sono ottimali grazie alla buona escursione termica giornaliera. Per ora non vengono segnalati particolari danni da infezioni di TICCHIALATURA e da insetti. Il terzo volo di CARPOCAPSA iniziato mediamente nella prima settimana di Agosto prosegue con cattura mediamente basse; non dovrà comunque essere abbassata l'attenzione in quanto il danno delle giovani larve causato in questo periodo compromette definitivamente la qualità del frutto.

I frutti in maturazione, possono essere danneggiati anche da larve di PIRALIDE specialmente se il frutteto si trova nelle vicinanze di incolti con erba alta o di coltivazioni di mais. Solitamente comunque l'entità dei danni è molto limitata.

#### CIMICE ASIATICA

Sono sempre presenti su tutte le colture uova, neanidi e adulti di CIMICE ASIATICA che dopo un leggera flessione di presenze registrata nel mese di Luglio, è nuovamente risalita. Gli adulti principalmente si osservano in vicinanza dei frutti mentre le neanidi molto più piccole tendono a muoversi velocemente su punti nascosti della vegetazione se disturbate dal movimento.

Sul territorio regionale è in corso il terzo lancio di *Trissolcus japonicus*.

#### VITE

Si trova mediamente in funzione della varietà e della località, nella fase di "fine invaiatura" o "inizio maturazione". Si osserva un anticipo medio a confronto del 2019 valutabile attualmente attorno ai 9 / 12 giorni. Le previsioni meteorologiche per questo fine settimana sono orientate verso una fase di instabilità che potrebbe dare origine a fenomeni temporaleschi e quindi si ripropone il pericolo di PERONOSPORA, BOTRITE e di eventuali danni da grandine e vento.

#### Situazione di campagna 19 Agosto 2020

**Uva:** Invaiatura quasi completa.

**Melo:** Sono in fase di raccolta le varietà a maturazione precoce.



Il prossimo aggiornamento verrà effettuato: Lunedì 24 Agosto 2020