



CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST

Informazioni agrometeorologiche, fitosanitarie ed osservazioni di campagna
www.agrinordest.it







Aprile 2019

N.23

Comunicato del 4 - 4 - 2019


Stagione **Primavera**
20/3/19 al 21/6/19

Previsioni per :		Venerdì 5	Sabato 6	Domenica 7	Lunedì 8
Stato del cielo					
Probabilità di precipitazione	00-12	Media 40%	Bassa 20%	Bassa 20%	Bassa 20%
	12-24	Bassa 20%	Bassa 20%	Media 50%	Bassa 15%
Fenomeni particolari		Nuvolosità a tratti intensa	Nuvolosità variabile	Rovesci/temporali	Nuvolosità variabile
Temperatura prevista		Massima 16,5 Minima 3,5	Massima 16,8 Minima 5,8	Massima 13,6 Minima 7,7	Massima 16,9 Minima 7,8
Sole :Sorge :Tramonta		6,50 19,49	6,48 19,50	6,46 19,51	6,45 19,53
Somme termiche 2019		e 2018	Media storica	Situazione generale:	
Base 0	568,3	533,3	519,1	Un nucleo depressionario posizionato sull'Oceano Atlantico, invia sulle nostre zone correnti di aria fredda ed instabile.	
Base 10	39,4	18,3	28,3		





Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia Zona collina - Aprile 2019



VARIE:

Le correnti di aria fredda provenienti da Nord Ovest, hanno finalmente determinato una variazione delle condizioni soleggiate e siccitose. L'ultima pioggia utile si era registrata nei giorni 1,2 e 3 di Febbraio. Anche le temperature sono velocemente diminuite ma comunque non hanno raggiunto valori che possano danneggiare le attuali condizioni vegetative delle varie colture.

Il ciliegio in questi giorni si trova nella fase di "piena fioritura", fase fenologica particolarmente esposta ad infezioni di MONILIA. Le infezioni possono essere favorite da periodi piovosi e prolungate bagnature. Oltre ai fiori anche i giovani germogli e le foglie possono essere interessate dall'infezione.

Il pesco si trova nella fase di "caduta petali", la fioritura è stata favorita da condizioni climatiche molto favorevoli e si stima una abbondante allegagione. E' iniziato su quasi tutto il territorio il primo volo di CYDIA MOLESTA; si consiglia a tal proposito la collocazione delle trappole sessuali negli appezzamenti da monitorare.

Il melo si trova nella fase fenologica di passaggio tra "apertura fiore centrale" e "piena fioritura" mentre il pero si trova in "piena fioritura". Attenzione alle recenti piogge che si stima potranno dare origine alle prime infezioni ASCOSPORICHE di TICCHIOLATURA su melo.

Situazione di campagna 3 Aprile 2019:

Ciliegio: Si trova nella fase di "piena fioritura". **Pesco:** fase di "caduta petali". E' iniziato il volo di CYDIA m.



Il prossimo aggiornamento verrà effettuato: Lunedì 8 Aprile 2019