




Informazioni agrometeorologiche, fitosanitarie ed osservazioni di campagna
www.agrinordest.it





Stagione Primavera
20/3 al 21/6

Previsioni per :		Venerdi 23	Sabato 24	Domenica 25	Lunedì 26
Stato del cielo					
Probabilità di precipitazione	00-12	Molto bassa 5%	Bassa 10%	Bassa 10%	Bassa 10%
	12-24	Bassa 10%	Bassa 10%	Bassa 10%	Bassa 10%
Fenomeni particolari		Nuvolosità variabile	Nuvolosità pomeridiana	Nuvolosità pomeridiana	Velature alla sera
Temperatura prevista		Massima 12,0 Minima -0,8	Massima 12,1 Minima 3,3	Massima 11,6 Minima 4,5	Massima 15,6 Minima 4,0
Sole :Sorge :Tramonta		6,14 18,32	6,12 18,34	7,10 19,35	7,8 19,36
Somme termiche 2018		e 2017	Media storica		
Base 0	405,5	427,2	390,5		
Base 10	4,5	15,5	10,8		
Situazione generale:					
Nei prossimi giorni la zona fredda presente sulle nostre zone si sposterà verso Nord-Est e le temperature ritorneranno a salire.					

Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia
Zona pianura - Marzo 2018



Grafici relativi alla durata in ore della bagnatura fogliare dei giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì.






Fasi lunari Marzo

Luna nuova Sabato 17
Ultimo quarto Venerdì 9
Luna piena Ven.2 / Sab 31
Primo quarto Sabato 24

Informazioni agrometeorologiche, fitosanitarie ed osservazioni di campagna
www.agrinordest.it

Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia Zona collina - Marzo 2018



VARIE:

Dalle lettura delle previsioni a breve-medio termine, dovrebbe essere domani Venerdì 23, l'ultimo giorno a rischio gelo, in quanto la massa di aria fredda che da giorni ha stazionato sulle nostre zone, si sposterà verso Nord-Est lasciando il posto a correnti più "primaverili". Mediamente ad oggi sono state registrate temperature minime notturne variabili da -2,5 a -0,5, in funzione della località e della esposizione. Le temperature più basse hanno principalmente interessato la fascia collinare e le zone limitrofe, mentre la zona di pianura è stata "protetta" da formazioni nuvolose e dalla presenza del vento.

Questa fase fredda ha rallentato molto tutte le fasi fenologiche; in particolare su pesco che si trova nella fase di "bottone rosa" da circa dieci giorni. Con l'aumento termico previsto nei prossimi fine settimana è probabile che si avrà una veloce fioritura di tutte le varietà. Si ricorda che nell'anno 2017 l'inizio fioritura è stato osservato nei giorni 17/18 marzo e la piena fioritura nei giorni 21/22, confermando quindi il ritardo causato dal freddo di quest'anno.

Su actinidia in questo periodo si è osservato l'inizio dell'ingrossamento delle gemme e l'inizio della guttazione (pianto) segnale tipico dell'inizio della attività vegetativa. Le condizioni fredde e umide della stagione invernale hanno favorito la diffusione e lo sviluppo di molte infezioni di PSA che in questi giorni si rendono particolarmente evidenti per le colature di linfa rugginosa.

21 Marzo 2018 situazione di campagna:

Actinidia: Inizio "pianto", fase fenologica "rigonfiamento gemma", presenza diffusa di PSA su tutto il territorio.



Il prossimo aggiornamento verrà effettuato: Lunedì 26 Marzo 2018