



CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST

Informazioni agrometeorologiche, fitosanitarie ed osservazioni di campagna
www.agrinordest.it

Aprile 2018


N.25

Comunicato del 5 - 4 - 2018






Stagione Primavera 20/3 al 21/6

Previsioni per :		Venerdi 6	Sabato 7	Domenica 8	Lunedì 9
Stato del cielo					
Probabilità' di precipitazione	00-12	Bassa 10%	Bassa 10%	Bassa 15%	Media 40%
	12-24	Bassa 10%	Bassa 10%	Bassa 20%	Media 50%
Fenomeni particolari		Foschie al mattino	Nuvolosità in montagna	Nuvolosità cumuliforme	Nuvolosità consistente
Temperatura prevista		Massima 19,9 Minima 6,5	Massima 19,1 Minima 7,8	Massima 20,0 Minima 6,2	Massima 14,5 Minima 8,5
Sole :Sorge :Tramonta		6,48 19,50	6,46 19,52	6,44 19,53	6,42 19,54

Somme termiche 2018	e 2017	Media storica	Situazione generale: Un cuneo di alta pressione si posizionerà sulle nostre zone fino alla giornata di Domenica garantendo fino ad allora condizioni soleggiate.	
Base 0	544,7	627,8		530,9
Base 10	19,7	76,1		31,3




Grafici relativi alla durata in ore della bagnatura fogliare dei giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì.





Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia Zona collina - Aprile 2018



VARIE:

Insistono in questi primi giorni di Aprile, ripetendo quasi la situazione meteorologica degli ultimi di Marzo, condizioni altamente instabili con precipitazioni intermittenti ma con quantitativi medio-bassi. Anche l'umidità si mantiene elevata e tale situazione favorisce lunghi periodi di bagnatura, particolarmente favorevoli ad infezioni di TICCHIOLATURA su melo e pero, MONILIA su albicocco e di BOLLA su pesco.

Il melo si trova in questi giorni nella fase tra "orecchiette di topo" e "mazzetti affioranti" in funzione della varietà considerata. E' probabile che in questo fine settimana, si passi velocemente alla fase successiva di "bottoni rosa".

Il pero si trova nella fase di "mazzetti divaricati" e sempre nel fine settimana sarà molto probabile l'"inizio fioritura".

In quasi tutti gli areali la vite si trova nella fase di "gemma cotonosa"; e' possibile osservare in questo periodo qualche presenza sui tralci di larve di NOTTUE che danneggiano le giovani gemme che iniziano a schiudersi. Valutare la quantità della popolazione per eventualmente pianificare un intervento contenitivo.

4 Aprile 2018 situazione di campagna:

Melo: fase di passaggio tra "orecchiette di topo" e "mazzetti affioranti". **Pero :**Fase di "mazzetti divaricati"



Il prossimo aggiornamento verrà effettuato: Lunedì 9 Aprile 2018