



CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST

Agosto 2018

N.53


Comunicato del 2 - 8 - 2018

Informazioni agrometeorologiche, fitosanitarie ed osservazioni di campagna
www.agrinordest.it





Stagione Estate
22/6 al 23/9

Previsioni per :		Venerdì 3	Sabato 4	Domenica 5	Lunedì 6
Stato del cielo					
Probabilità di precipitazione	00-12	Bassa 10%	Bassa 15%	Bassa 10%	Bassa 20%
	12-24	Media 40%	Bassa 10%	Bassa 20%	Bassa 20%
Fenomeni particolari		Temporali nel pomeriggio/sera	Nuvolosità al mattino	Velature al mattino	Nuvolosità variabile
Temperatura prevista		Massima 21,1 Minima 32,3	Massima 34,1 Minima 20,2	Massima 34,0 Minima 20,3	Massima 31,8 Minima 21,1
Sole :Sorge :Tramonta		6,03 20,41	6,04 20,40	6,05 20,39	6,06 20,37
Somme termiche 2018		e 2017	Media storica		Situazione generale: Le condizioni di alta pressione si mantengono ancora sulle nostre zone. Isolati temporali di calore saranno probabili durante le ore serali.
Base 0	3067,2	3119,1	2877,1		
Base 10	1381,8	1378,8	1194,8		

Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia
Zona pianura - Luglio 2018




Grafici relativi alla durata in ore della bagnatura fogliare dei giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì.





Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia Zona collina - Luglio 2018



PESCO

Il volo di *Cydia molesta* si presenta particolarmente consistente, contrariamente al secondo e al terzo. Su piante spia non trattate, si osservano in questo periodo, evidenti danni sia sui frutti sia sui germogli. L'andamento climatico particolarmente umido e caldo ha favorito lo sviluppo di infezioni di *MONILA* che riescono velocemente a diffondersi all'interno del frutteto se non efficacemente prevenute sia mediante interventi fitoiatrici sia mediante una attenta potatura delle piante e ad una corretta gestione della irrigazione.

MELO

Sono prossimi i primi stacchi delle varietà precoci del gruppo gala. La colorazione e la pezzatura si presentano ottimali. Per ora non sono evidenti significativi danni da *CARPOCAPSA* e da *CIMICE* che sono diventati i due insetti chiave nella difesa della coltura. Sulle altre varietà, non deve essere abbandonata la difesa sia verso questi insetti sia nei confronti di *TICCHIOLATURA* e *ALTERNARIA*.

In questo periodo possono essere presenti sulla vegetazione (e sui frutti) le larve di *CARPOCAPSA* nate dalle uova deposte dagli adulti del terzo volo.

VITE

Si trova mediamente nella fase di "invaiaura". Prosegue la fase di forte virulenza della *PERONOSPORA* e *OIDIO*, che se non adeguatamente controllate, si ritrovano continuamente sulla giovane vegetazione. Con l'avvicinarsi della maturazione aumenta il rischio di *BOTRITE* specialmente in caso di rotture degli acini causate da temporali (grandine, vento).

Continuano ad essere elevate le catture di *LOBESIA* nelle trappole sessuali. .

1 Agosto 2018 situazione di campagna:

Melo: Sono prossime le raccolte delle varietà precoci. **Soia:** Controllare i bordi per valutare la presenza di *Halyomorpha h.*, che con le punture effettuate, può provocare disseccamento dei baccelli.



Il prossimo aggiornamento verrà effettuato: Lunedì 6 Agosto 2018