



CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST

Febbraio 2017

N.9


Comunicato del 9 - 2 - 2017

Informazioni agrometeorologiche, fitosanitarie ed osservazioni di campagna
www.agrinordest.it


Stagione
Inverno
22/12 al 20/3

Previsioni per :		Venerdì 10	Sabato 11	Domenica 12	Lunedì 13
Stato del cielo					
Probabilità di precipitazione	00-12	Media 60%	Media 40%	Bassa 20%	Bassa 15%
	12-24	Media 60%	Bassa 20%	Bassa 20%	Bassa 10%
Fenomeni particolari		Nuvolosità consistente/piogge	Nuvolosità consistente	Nuvolosità variabile	Nuvolosità in diminuzione
Temperatura prevista		Massima 6,0 Minima 2,7	Massima 8,3 Minima 3,5	Massima 11,1 Minima 4,9	Massima 11,0 Minima 5,0
Sole :Sorge :Tramonta		7,25 17,36	7,23 17,38	7,22 17,39	7,21 17,41
Somme termiche 2017		e 2016		Media storica	
Base 0		87,5		156,1	
Base 10		0,0		0,0	
				Situazione generale: Nelle prossime 48 ore l'Italia sarà interessata da correnti atlantiche che daranno origine a condizioni di elevata copertura e deboli piogge.	





Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia Zona pianura - Febbraio 2017



Grafici relativi alla durata in ore della bagnatura fogliare dei giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì.



Giorni di pioggia
Media mensile : 6
Dal 1 Febbraio al 8: 5





Fasi lunari Febbraio

Luna nuova Domenica 26


Ultimo quarto Sabato 18

Luna piena Sabato 11

Primo quarto Sabato 4

Informazioni agrometeorologiche, fitosanitarie ed osservazioni di campagna
www.agrinordest.it

Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia Zona collina - Febbraio 2017



VARIE:

Le correnti Atlantiche oltre ad un buon apporto di pioggia, hanno determinato come previsto, un sensibile aumento delle temperature in particolare delle minime notturne che in questi primi giorni di Febbraio, non sono mai scese al di sotto dello zero.

Analizzando la situazione attuale e considerando l'accumulo delle somme termiche a base 0 dall'inizio dell'anno, si può osservare che a confronto con il 2016 si valuta un "ritardo" stagionale di circa 8/10 giorni. Dalle osservazioni fenologiche delle colture arboree che normalmente iniziano precocemente l'attività vegetativa (Albicocco, Susino) questo però risulta poco evidente. Si è osservata una leggera attività linfatica in Actinidia durante le ore più calde della giornata. Su Mandorlo si nota qualche differenza; nel 2016 in questi giorni era evidente un rigonfiamento delle gemme con parti verdi visibili, mentre attualmente si registra solamente un leggero inizio di rigonfiamento.



Il prossimo aggiornamento verrà effettuato: Lunedì 13 Febbraio 2017