





Previsioni per :		Venerdì 16	Sabato 17	Domenica 18	Lunedì 19
Stato del cielo					
Probabilità di precipitazione	00-12	Media 40%	Bassa 20%	Bassa 10%	Bassa 10%
	12-24	Media 50%	Bassa 20%	Bassa 20%	Bassa 15%
Fenomeni particolari		Rovesci/temporali	Nuvolosità a tratti consistente	Nuvolosità variabile	Nuvolosità variabile
Temperatura prevista		Massima 26,5 Minima 18,5	Massima 31,0 Minima 19,5	Massima 32,0 Minima 22,5	Massima 32,0 Minima 21,0
Sole :Sorge :Tramonta		5,44 21,01	5,45 21,00	5,46 20,59	5,47 20,58

Somme termiche 2021			e 2020	Media storica	Situazione generale Una zona di bassa pressione centrata sul Nord Italia mantiene condizioni instabili con alternanza di piogge e schiarite.
Base 0	2479,6	2608,1	2450,9		
Base 10	933,1	999,9	942,6		





Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia
Zona pianura - Luglio 2021



Grafici relativi alla durata in ore della bagnatura fogliare dei giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì.




Giorni di pioggia: **Luglio**
Media mensile: 9
Dal 1 Luglio al 14: 5





Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia Zona collina - Luglio 2021



VARIE:

Dopo un Giugno povero di precipitazioni, questa prima quindicina di Luglio, si è presentata particolarmente piovosa, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco (come normalmente avviene in questo periodo) che localmente hanno assunto carattere di forte intensità (nubifragio), grandine e vento forte. E' purtroppo un "male di stagione" che viene favorito dal forte riscaldamento del terreno e dalla conformazione orografica del nostro territorio in grado di dare origine a celle temporalesche a volte molto consistenti.

Sono in corso i monitoraggi per determinare l'inizio del volo di PIRALIDE. Allo stato attuale non sono state ancora osservate catture di adulti; si trovano crisalidi all'interno degli stocchi che considerando il valore attuale della somma termica, si stima possano iniziare lo sfarfallamento nella prossima settimana.

Le catture di CARPOCAPSA sono mediamente basse; sono attualmente presenti sulla vegetazione le larve di seconda generazione e su testimoni non trattati si sono osservati i relativi danni sui frutti. In questo periodo sui frutti è possibile osservare anche danni da CYDIA MOLESTA, molto simili a quelli provocati da CARPOCAPSA.

Neanidi e adulti di CIMICE ASIATICA sono presenti su tutto il territorio e dai monitoraggi effettuati sul territorio il numero di individui è in ulteriore aumento. Si consiglia un attento controllo dell'insetto sia con interventi specifici sia mediante sistemi di catture massali.

Situazione di campo del 14 Luglio :

Mais: PIRALIDE crisalidi all'interno del fusto.

CIMICE: presenza di ovature e neanidi



Il prossimo aggiornamento verrà effettuato: Lunedì 19 Luglio 2021