



# CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST

Informazioni agrometeorologiche, fitosanitarie ed osservazioni di campagna  
www.agrinorddest.it







Febbraio 2017

N.12

Comunicato del 20-2-2017


Stagione Inverno  
22/12 al 20/3

Previsioni per :		Martedì 21	Mercoledì 22	Giovedì 23	Febbraio 2016	
Stato del cielo					Lun.22	
Probabilità di precipitazione	00-12	Bassa 10%	Bassa 15%	Bassa 20%	Mar.23	
	12-24	Bassa 15%	Bassa 15%	Bassa 20%	Mer.24	
Fenomeni particolari		Foschie dense/nebbie	Nuvolosità pomeridiana	Nuvolosità a tratti consistente	Gio.25	
Temperatura prevista		Massima 12,6 Minima 3,3	Massima 10,2 Minima 5,4	Massima 11,6 Minima 6,9	Ven.26	
Sole :Sorge :Tramonta		7,08 17,52	7,06 17,53	7,05 17,55	Sab.27	
Somme termiche 2017		e 2016		Valori simili nel 2016 sono stati raggiunti il	<b>Situazione generale</b>	
Base 0	150,1	230,8	7 Febbraio	La pressione, nei prossimi giorni, subirà una flessione verso il basso per il transito di un debole fronte freddo. Non sono previste piogge.		
Base 10	0,0	0,0	-----			





### Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia Zona collina - Febbraio 2017



#### VARIE:

Le temperature medie giornaliere, si mantengono leggermente al di sopra delle serie storiche previste per il periodo. Solamente in questi ultimi due giorni si sono riportate sui valori medi o leggermente al di sotto. Anche le minime notturne dopo la risalita della prima decade, si sono nuovamente riportate su valori prossimi allo zero o leggermente inferiori. Sono infatti ricomparse le brinate al mattino.

I valori del terreno fin dai primi giorni del mese, si mantengono al di sopra delle medie storiche di circa 1,0 / 1,5 gradi; nell'ultimo periodo tendono leggermente ad una nuova leggera diminuzione.

Il valore attuale per le normali colture arboree è ancora mediamente basso per favorire una evidente attività vegetativa che normalmente avviene quando viene raggiunta e superata la soglia dei 7,5 / 8,0 gradi la quale mediamente viene raggiunta attorno alla prima decade di Marzo.

Il fenomeno del leggero inizio di guttazione osservato sui tagli di Actinidia, in questa ultima settimana si è notevolmente attenuato.

Dal conteggio delle sommatorie termiche si continua ad osservare un "ritardo" stagionale a confronto con il 2016 di circa 10/13 giorni.

Su pesco in questa settimana valutata la attuale fase fenologica di "gemma rigonfia" e stimata la probabile evoluzione dei prossimi giorni, è consigliato l'intervento per la prevenzione della BOLLA.

**Il prossimo aggiornamento verrà effettuato : Giovedì 23 Febbraio 2017**