




Informazioni agrometeorologiche, fitosanitarie ed osservazioni di campagna
www.agrinordest.it


Stagione
Inverno
22/12 al 20/3

Previsioni per :		Venerdì 17	Sabato 18	Domenica 19	Lunedì 20	
Stato del cielo						
Probabilità di precipitazione	00-12	Bassa 10%	Bassa 10%	Bassa 15%	Bassa 20%	
	12-24	Bassa 10%	Bassa 15%	Bassa 15%	Bassa 20%	
Fenomeni particolari		Velature pomeridiane	Nuvolosità cumuliforme	Nuvolosità cumuliforme	Aumento della nuvolosità	
Temperatura prevista		Massima 21,2 Minima 4,4	Massima 22,3 Minima 6,4	Massima 22,3 Minima 6,5	Massima 21,2 Minima 5,6	
Sole :Sorge :Tramonta		6,25 18,25	6,23 18,26	6,21 18,27	6,19 18,29	
Somme termiche 2017		e 2016	Media storica	Situazione generale: Situazione ancora di alta pressione e condizioni soleggiate fino a Domenica. Probabile aumento della copertura da Lunedì.		
Base 0		357,4	432,6			320,0
Base 10		5,7	2,8			4,5





Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia
Zona pianura - Marzo 2017



Grafici relativi alla durata in ore della bagnatura fogliare dei giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì.



Giorni di pioggia
Media mensile : 6
Dal 1 Marzo al 15: 3






Fasi lunari Marzo

Luna nuova Martedì 28
Primo quarto Domenica 5
Luna piena Domenica 12
Ultimo quarto Lunedì 20

Informazioni agrometeorologiche, fitosanitarie ed osservazioni di campagna
www.agrinordest.it

Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia Zona collina - Marzo 2017



VARIE DI STAGIONE:

Prosegue la fase meteorologicamente stabile con caratteristiche climatiche tipicamente primaverili che favorisce la rapida ripresa vegetativa. Per ora la vegetazione è ancora tenuta frenata dal basso contenuto idrico del terreno e dalla basse temperature notturne che raggiungono ancora valori prossimi ai 2,0 / 3,0 gradi. La temperatura del terreno ha invece raggiunto temperature ottimali per l'inizio della attività radicale.

Il Melo si trova in questi giorni nella fase di passaggio tra "punte verdi" e "orecchiette di topo" ; è questo il classico periodo in cui inizia la sensibilità alle infezioni primarie di TICCHIOLATURA in caso di condizioni favorevoli (pioggia, bagnatura). Sono iniziate nelle trappole sessuali le catture di EULIA.

L'albicocco si trova nella fase di "fioritura" e si trova quindi particolarmente esposto in caso di pioggia ad infezioni di MONILIA.

Il pesco è nella fase di passaggio tra "bottone rosa" e "inizio fioritura". Sono presenti le prime foglioline apicali con ancora poca superficie esposta ma in caso di periodi di bagnatura prolungati potrebbero essere interessate da infezioni di BOLLA. Si ricorda che gli interventi contro questa crittogama devono essere basati sulla prevenzione.

Situazione di campagna 15 Marzo 2017

Albicocco: "piena fioritura". **Pesco:** fase di " bottone rosa" e/o "fioritura". **Melo:** prime catture di Eulia.



Il prossimo aggiornamento verrà effettuato: Lunedì 20 Marzo 2017