



CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST

Marzo 2017

N.21


Comunicato del 23-3-2017

Informazioni agrometeorologiche, fitosanitarie ed osservazioni di campagna
www.agrinordest.it


Stagione Primavera
20/3 al 21/6

Previsioni per :		Venerdì 24	Sabato 25	Domenica 26	Lunedì 27	
Stato del cielo						
Probabilità di precipitazione	00-12	Bassa 20%	Bassa 15%	Media 40%	Bassa 20%	
	12-24	Bassa 20%	Bassa 20%	Media 40%	Bassa 20%	
Fenomeni particolari		Nuvolosità variabile	Nuvolosità in montagna	Temporali e schiarite	Nuvolosità variabile	
Temperatura prevista		Massima 20,9 Minima 7,6	Massima 21,5 Minima 7,1	Massima 17,6 Minima 9,0	Massima 16,3 Minima 5,1	
Sole :Sorge :Tramonta		6,12 18,34	6,10 18,35	7,08 19,36	7,06 19,38	
Somme termiche 2017		e 2016	Media storica	Situazione generale: Permane sull'Italia una situazione di spiccata variabilità. Correnti da Sud ovest interesseranno le nostre zone nelle prossime ore.		
Base 0		439,7	503,2			388,5
Base 10		18,0	7,1			10,5





Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia Zona pianura - Marzo 2017



Grafici relativi alla durata in ore della bagnatura fogliare dei giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì.



Giorni di pioggia
Media mensile : 6
Dal 1 Marzo al 22: 3






Fasi lunari Marzo

Luna nuova Martedì 28
Primo quarto Domenica 5
Luna piena Domenica 12
Ultimo quarto Lunedì 20

Informazioni agrometeorologiche, fitosanitarie ed osservazioni di campagna
www.agrinordest.it

Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia Zona collina - Marzo 2017



VARIE DI STAGIONE:

Le temperature medie giornaliere si mantengono ancora al di sopra delle serie storiche stagionali di circa 1,5 / 2,0 gradi, e questo favorisce una vistosa attività vegetativa di arboree ed erbacee in genere.

Sempre molto basso o nullo è invece il quantitativo di pioggia che raggiunge ad ieri mediamente gli 80 mm dall'inizio dell'anno; nel 2016 nello stesso periodo ne erano caduti 232,0 a confronto di un quantitativo atteso medio di 109,0 mm.

Il pesco si trova nella fase di "piena fioritura" presentando a confronto con il 2016 un leggero anticipo di circa 2/3 giorni.

L'actinidia si trova mediamente nella fase di "nervature visibili" con qualche differenza come sempre accade tra le gemme apicali e le basali sullo stesso tralcio. Si osservano sui tralci e sui tronchi, presenze di essudati attribuibili ad infezioni di PSA (Batteriosi) su soggetti che apparentemente nell'anno appena trascorso si presentavano sani (?). Si consiglia per ora l'eliminazione, per quanto possibile, e l'allontanamento dal frutteto, dei tralci interessati dalle infezioni in attesa della nuova vegetazione che permetta una effettiva valutazione dell'entità dell'infezione.

Il Melo è nella fase di passaggio tra "orecchiette di topo" e " mazzetti affioranti". Attenzione in caso di pioggia alle probabili infezioni primarie di TICCHIOLATURA.

Situazione di campagna 22 Marzo 2017

Actinidia: fase di "nervature visibili". Attenzione alle infezioni di PSA

Pesco: fase di "piena fioritura"



Il prossimo aggiornamento verrà effettuato: Lunedì 27 Marzo 2017