



CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST

Informazioni agrometeorologiche, fitosanitarie ed osservazioni di campagna
www.agrinorddest.it







Aprile 2017

N.26

Comunicato del 10-4-2017


Stagione Primavera
20/3 al 21/6

Previsioni per :		Martedì 11	Mercoledì 12	Giovedì 13	Aprile 2016	
Stato del cielo					Lun.11	
Probabilità di precipitazione	00-12	Bassa 10%	Bassa 10%	Bassa 10%	Mar.12	
	12-24	Bassa 20%	Bassa 20%	Bassa 10%	Mer.13	
Fenomeni particolari		Nuvolosità variabile	Isolati temporali	Velature al mattino	Gio.14	
Temperatura prevista		Massima 23,4 Minima 9,2	Massima 19,9 Minima 10,8	Massima 23,4 Minima 7,8	Ven.15	
Sole :Sorge :Tramonta		6,38 19,57	6,36 19,58	6,34 20,00	Sab.16	
Somme termiche 2017		e 2016		Valori simili nel 2016 sono stati raggiunti il	Situazione generale	
Base 0	699,1	737,7	6 Aprile	La pressione si mantiene su livelli medio alti. Deboli infiltrazioni di aria fredda sono attese Mercoledì con probabili fenomeni temporaleschi.		
Base 10	97,4	62,4	15 Aprile			





Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia Zona collina - Aprile 2017



VARIE:

Le fasi fenologiche si susseguono velocemente su tutte le colture e permane l'anticipo vegetativo di circa 8/ 10 giorni rispetto al 2016. Inizia ad essere "vistosa" la carenza di pioggia su tutte le colture erbacee, sia seminate di recente sia su frumenti che attualmente si trovano in fase di "levata". Il colza in questi giorni si trova nella fase di "fioritura".

Nei giorni 8 / 9 è iniziato su tutto il territorio, come da previsioni il volo di CARPOCAPSA con un anticipo anche in questo caso di circa 7 / 9 giorni. Si consiglia a tal proposito il posizionamento delle trappole sessuali nei frutteti per il corretto e completo controllo del volo. E' il momento ideale per l'esposizione dei dispenser per la confusione sessuale.


La vite presenta come solitamente accade nel periodo primaverile, una evidente disformità fenologica in relazione alle varietà, alle zone considerate e all'epoca di potatura.. Mediamente si trova nella fase di "foglie distese" ma in alcuni areali si osservano anche i primi germogli di lunghezza superiore ai 10/15 cm con "grappoli visibili" o "grappoli separati". E' stato osservato anche l'inizio del primo volo di LOBESIA b.

Situazione di campagna 9 Aprile 2017

Vite: fase "grappoli visibili" e "grappoli separati"; presenza di Lobesia b. **Carpocapsa:** prime catture di adulti



ET0 Aprile 2017 dal giorno 3 al 9



Il prossimo aggiornamento verrà effettuato : Giovedì 13 Aprile 2017