



CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST

Maggio 2017

N.31


Comunicato del 4 - 5 - 2017

Informazioni agrometeorologiche, fitosanitarie ed osservazioni di campagna
www.agrinordest.it






Stagione **Primavera**
20/3 al 21/6

Previsioni per :		Venerdì 5	Sabato 6	Domenica 7	Lunedì 8
Stato del cielo					
Probabilità di precipitazione	00-12	Bassa 10%	Media 50%	Bassa 20%	Media 40%
	12-24	Bassa 10%	Bassa 20%	Media 40%	Media 40%
Fenomeni particolari		Nuvolosità pomerifiana	Nuvolosità variabile/piogge	Piogge al mattino /schiarite	Nuvolosità consistente
Temperatura prevista		Massima 20,4 Minima 9,0	Massima 19,9 Minima 10,8	Massima 23,6 Minima 11,2	Massima 19,2 Minima 13,6
Sole :Sorge :Tramonta		5,59 20,28	5,57 20,29	5,56 20,30	5,55 20,31
Somme termiche 2017		e 2016		Media storica	
Base 0	1029,9	1088,0	917,7	Situazione generale: Si manterrà anche nei prossimi giorni una situazione di elevata instabilità con veloce alternanza di schiarite, annuvolamenti e piogge.	
Base 10	189,6	172,7	137,7		

Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia Zona pianura - Maggio 2017



Grafici relativi alla durata in ore della bagnatura fogliare dei giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì.






Fasi lunari Maggio

Luna nuova Giovedì 25
Primo quarto Mercoledì 3
Luna piena Mercoledì 10
Ultimo quarto Venerdì 19

Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia Zona collina - Maggio 2017



VARIE:

Questi primi giorni di Maggio sono stati caratterizzati da temperature medie giornaliere particolarmente fresche con valori che si sono posizionati al di sotto delle serie storiche del periodo di circa 3,5 / 4.0 gradi. Le piogge distribuite sul territorio poco uniformemente hanno comunque apportato acqua che specialmente sui cereali si è rivelata particolarmente utile. Anche nei prossimi giorni le condizioni rimarranno stazionarie con spiccata variabilità e frequenti rovesci o temporali. Le temperature in particolare le minime notturne si manterranno sugli attuali valori con una leggera tendenza alla diminuzione verso Domenica.

ACTINIDIA:

Le temperature che avevano favorito la veloce vegetazione e una altrettanto veloce comparsa dei boccioli fiorali, dal giorno 19 si sono riportate su valori medi stagionali e/o al di sotto, determinando un sensibilissimo rallentamento della fase fenologica ferma ad oggi a "boccioli fiorali ingrossati". Non sono per ora valutabili eventuali danni da freddo ai boccioli dei fiori femminili che si presentano ancora compatti senza particolari imbrunimenti. Si osservano sporadiche aperture di fiori maschili in località particolarmente riparate.

PESCO:

Mediamente ha superato la fase di "frutto giovane" e anche se rallentato si osserva un graduale ingrossamento dei frutticini. Il volo di CYDIA M. si è praticamente azzerato su tutto il territorio per il termine della fase del primo volo; su piante non trattate si osservano presenze di danni su germogli e su qualche frutto. Si segnala la presenza di OIDIO su frutti di varietà sensibili.

Situazione di campagna 3 Maggio 2017

Frumento: danni da gelata del giorno 19 e 20

Pesco: presenza di OIDIO su varietà sensibili.



Il prossimo aggiornamento verrà effettuato: Lunedì 8 Maggio 2017