



# CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST

Informazioni agrometeorologiche, fitosanitarie ed osservazioni di campagna  
www.agrinordest.it







Giugno 2017

N.43

Comunicato del 15 - 6 - 2017

Stagione Primavera  
20/3 al 21/6

Previsioni per :		Venerdì 16	Sabato 17	Domenica 18	Lunedì 19	
Stato del cielo						
Probabilità di precipitazione	00-12	Bassa 15%	Molto bassa 5%	Molto bassa 5%	Bassa 10%	
	12-24	Bassa 15%	Bassa 10%	Bassa 10%	Bassa 10%	
Fenomeni particolari		Nuvolosità variabile	Velature al mattino	Velature al mattino	Nuvolosità pomeridiana	
Temperatura prevista		Massima 32,8 Minima 18,2	Massima 29,7 Minima 18,5	Massima 27,9 Minima 16,7	Massima 30,0 Minima 14,9	
Sole :Sorge :Tramonta		5,27 21,06	5,27 21,07	5,27 21,07	5,28 21,07	
<b>Somme termiche 2017</b>		<b>e 2016</b>	<b>Media storica</b>	<b>Situazione generale:</b> La pressione , dopo la diminuzione di ieri, tenderà velocemente ad aumentare e si ristabiliranno condizioni soleggiate.		
<b>Base 0</b>		<b>1902,2</b>	<b>1862,5</b>			<b>1725,2</b>
<b>Base 10</b>		<b>641,9</b>	<b>527,3</b>			<b>525,3</b>






#### Fasi lunari Giugno

Luna nuova Sabato 24  
Primo quarto Giovedì 1  
Luna piena Venerdì 9  
Ultimo quarto Sabato 17

Informazioni agrometeorologiche, fitosanitarie ed osservazioni di campagna  
[www.agrinorddest.it](http://www.agrinorddest.it)

### Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia Zona collina - Giugno 2017



#### VARIE:

Ancora una volta i temporali di ieri sera/ notte, hanno apportato nelle zone di pianura quantitativi mediamente bassi o nulli, concentrando le piogge in zone puntiformi e principalmente in collina e montagna. Permane quindi nelle zone di pianura la condizione di carenza di precipitazione. Dalle previsioni a medio-lungo termine questa condizione si presenterà stazionaria per tutta la prossima settimana, interrotta solamente da qualche isolato temporale.

Frumento e Orzo si trovano in questo periodo nella fase fenologica di "maturazione" con qualche variazione in funzione dell'epoca di semina e della varietà. Le condizioni soleggiate e di bassa piovosità favoriscono questa fase e le relative operazioni di raccolta.

Le risaie dopo la fase di "asciutta" per favorire la radicazione dopo la nascita del seme, sono in questi giorni nuovamente "sommerse". La vigoria delle giovani piante si presenta ottimale, anche questa, favorita dalle temperature di questi giorni.

Il mais è nella fase di passaggio tra "fine della levata" e "inizio fioritura". Il "blocco" vegetativo che si era osservato come conseguenza del freddo di Aprile, sembra non aver avuto ripercussioni particolari. Si raccomanda di non far mancare un adeguato rifornimento idrico considerando che in questo periodo l'evapotraspirazione giornaliera si aggira mediamente sui 4,5 / 5,0 mm. Si sono trovati i primi adulti di DIABROTICA sulla vegetazione.

#### Situazione di campagna 14 Giugno 2017

**Riso:** Si trova mediamente nella fase di "sviluppo delle foglie" **Frumento:** Fase fenologica di "maturazione"



**Il prossimo aggiornamento verrà effettuato: Lunedì 19 Giugno 2017**