




Informazioni agrometeorologiche, fitosanitarie ed osservazioni di campagna  
www.agrinordest.it






Stagione  
**Autunno**  
22/9 al 21/12

Previsioni per :		Venerdi 6	Sabato 7	Domenica 8	Lunedì 9	
Stato del cielo						
Probabilità di precipitazione	00-12	Bassa 20%	Bassa 15%	Bassa 10%	Bassa 10%	
	12-24	Media 40%	Bassa 15%	Bassa 10%	Bassa 15%	
Fenomeni particolari		Isolati temporali	Minime notturne in diminuzione	Nuvolosità variabile	Foschie/nebbie al mattino	
Temperatura prevista		Massima 16,8 Minima 11,7	Massima 18,5 Minima 4,5 ↓	Massima 20,0 Minima 6,0 ↓	Massima 20,5 Minima 5,8 ↓	
Sole :Sorge :Tramonta		7,21 18,47	7,22 18,45	7,23 18,43	7,24 18,41	
<b>Somme termiche 2017</b>		<b>e 2016</b>	<b>Media storica</b>	<b>Situazione generale:</b> Le correnti tenderanno nelle prossime ore ad orientarsi da Nord-Est, entrando senza ostacoli sulle nostre zone. E' atteso un calo termico.		
<b>Base 0</b>		<b>4497,1</b>	<b>4479,8</b>			<b>4200,0</b>
<b>Base 10</b>		<b>2116,8</b>	<b>2024,6</b>			<b>1880,0</b>

Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia  
Zona pianura - Ottobre 2017



Grafici relativi alla durata in ore della bagnatura fogliare dei giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì.






#### Fasi lunari Ottobre

Luna nuova Giovedì 19  
Primo quarto Sabato 28  
Luna piena Giovedì 5  
Ultimo quarto Giovedì 12

### Andamento temperature medie,minime,massime,pioggia Zona collina - Ottobre 2017



#### VARIE:

Proseguono le raccolte delle varietà medio-tardive - tardive delle mele. L'escursione termica è sempre ottimale per favorire nelle varietà rosse una buona colorazione. La situazione fitosanitaria permane buona, anche questa favorita dall'andamento climatico che fino ad ieri non ha dato origine a periodi di bagnatura particolarmente lunghi. Su piante spia (non trattate) di varietà sensibili alle infezioni di OIDIO, si osservano presenze di infezione sia su foglia che su rametto. Si raccomanda la massima attenzione nei confronti di questa crittogama che se non adeguatamente controllata potrebbe danneggiare i futuri germogli fin dalla fase di apertura delle gemme nella prossima stagione.

E' iniziato il viraggio cromatico su molte varietà di pesco. I soggetti giovani come solitamente accade si presentano ancora in pieno vigore vegetativo, mentre sulle piante già in produzione si osservano le primissime filloptosi. Attenzione agli anomali "arrossamenti" fogliari che potrebbero evidenziare o infezioni da FITOPLASMI o danni da CICALINA. Un corretto riconoscimento dei sintomi è molto importante per una futura pianificazione degli interventi fitosanitari o agronomici.



#### Situazione di campagna del 4 Ottobre 2017

**Melo:** attenzione alle presenze di OIDIO su germogli specialmente su varietà sensibili alla crittogama.

**Pesco:** Arrossamenti fogliari autunnali da controllare. **Olivo:** Fase fenologica di "Inizio invaiatura".

**Il prossimo aggiornamento verrà effettuato: Lunedì 9 Ottobre 2017**